

TABLA I

MECANISMOS DE ACCIÓN DE DROGAS QUE SE ASOCIAN A SÍNDROME SEROTONINÉRGICO

<i>Síntesis de 5-HT</i>	<i>Liberación de 5-HT</i>	<i>Inhibición de recaptación 5-HT</i>	<i>Inhibición del metabolismo de 5-HT</i>	<i>Estimulación receptor post-sináptico</i>
L-triptófano 5-hidroxitriptófano	Anfetaminas y derivados Dextroanfetamina Metanfetamina Fenfluramina Dexfenfluramina Fenteramina Éxtasis Cocaína Reserpina Tetrabenazina Levodopa IMAO Fenelzina Tranilcipromina Seleginina Moclobemida Isocarboxazida	ISRS Fluoxetina Paroxetina Sertralina Fluvoxamina Citalopram Trazodona Nefazodona Venlafaxina ADT Amitriptilina Imipramina Clomipramina Doxepina Desipramina Bupropión Dextrometorfano Tramadol Meperidina Sibutramina Cocaína Hipérico Anfetaminas y derivados	IMAO: Fenelzina Tranilcipromina Seleginina Moclobemida Hipérico Omeprazol Ácido Valproico Ketoconazol Linezolid Ritonavir	Buspirona Agonistas 5-HT ₁ Sumatriptán Zolmitriptán Naratriptán Rizatriptán Mirtazapina Litio Carbamazepina

IMAO: inhibidores de la recaptación de serotonina; ADT: antidepresivos tricíclicos; ISRS: inhibidores de la recaptación de serotonina; 5-HT₁: 5-hidroxi triptamina 1.

TABLA II


SÍNTOMAS MAYORES Y MENORES

<i>Alteración</i>	<i>Síntomas mayores</i>	<i>Síntomas menores</i>
Status mental	Confusión Coma	Hiperactividad Agitación Insomnio
Autonómica	Hipertermia Diaforesis (sudoración)	Taquicardia Taquipnea Disnea Hipo/Hipertensión Diarrea
Neuromuscular	Mioclonus e hipertonia (espontáneo, inducible, ocular) Hiperreflexia Temblor	Incoordinación Midriasis Akatisia Ataxia

Tabla 3. Tratamientos preventivos de la migraña^{10,12,26,38}.

Fármaco	Pauta posológica	Nivel evidencia ¹⁰	Situaciones de elección
β-bloqueantes	Metoprolol 50–200 mg/día en 2 tomas vía oral	I/A en ME IV en MC	Migraña con HTA, temblor, ansiedad, estrés, hipertiroidismo, embarazo
	Propranolol 40–240 mg/día en 2-3 tomas vía oral		
Antiepilépticos	Topiramato 25–200 mg/día vía oral	I/A en ME y MC	Migraña con epilepsia, sobrepeso
	Valproato 300-1500 mg/día vía oral*	I/A en ME III/C en MC	
Antidepresivos	Amitriptilina 10-75 mg/día vía oral al acostarse	I/A en ME	No se consideran de primera elección. ME y MC. Migraña con cefalea tensional, depresión, ansiedad, dolor neuropático, insomnio.
Antagonistas del calcio	Flunarizina 5-10 mg/día vía oral, preferentemente al acostar	I/A en ME IV/C en MC	Migraña con y sin aura en pacientes sin respuesta a β-bloqueantes y/o topiramato. Adultos con constitución delgada y sin tendencia a la depresión.
IECA/ARA II	Lisinopril* 5-20 mg/día vía oral	II/B en ME	Migraña con HTA
	Candesartan* 8-32 mg/día vía oral		
Toxina botulínica tipo A	155-195 unidades divididas en 31-39 puntos (5 unidades/punto) vía intramuscular cada 12 semanas	I/A en MC	Financiado en MC en pacientes sin respuesta o intolerantes a tratamientos preventivos orales

(*) Sin autorización de uso en migraña en España.



(